AVERTISSEMENT: La Pharmacie tient en stock différents médicaments étrangers dont la notice d'information n'est pas forcément en français. Afin de faciliter l'utilisation de ces produits, nous mettons à disposition ci-après une notice à but d'information en français sans valeur légale. Les informations sont reproduites sans modifications de sources diverses et concernent soit le produit en stock, soit un produit similaire disponible sur le marché français.

Pour plus d'informations, veuillez consulter l'Assistance pharmaceutique au 31 080.

Produit HUG : LYCLEAR® crème 5% 30g (pce)

DCI : perméthrine

Code article : 7963

Provenance : angleterre

Produit similaire : LOXAZOL® lotion 1%

Source d'information : Compendium (consulté le 17.07.14)

Remarque : Concentration différente entre les deux produits
5% = 50mg/g
1% = 10mg/g

La pharmacie des HUG décline toute responsabilité en cas d'utilisation des informations disponibles sur son site internet hors des HUG

Loxazol®

Interdelta SA

Composition

Principe actif: Permethrinum.

Excipients: Alcohol isopropylicus; Propylenglycolum; Aromatica; Color.: Jaune orangé S (E 110); Conserv.: parabène de méthyle et de propyle (E 216, E 218); Excip. ad emulsionem pro 1 g.

Forme galénique et quantité de principe actif par unité

Flacon de 59 ml de lotion contenant Permethrinum 10 mg/g.

Indications/Possibilités d'emploi

Loxazol est indiqué contre l'infestation par les poux (Pediculus humanus capitis). Loxazol peut aussi être employé à titre prophylactique pour une courte durée (8 semaines au maximum) lors d'une épidémie de poux.

Posologie/Mode d'emploi

Posologie habituelle

Chez les adultes et les enfants de plus de 2 ans: laver les cheveux avec un peu de shampooing et les sécher avec un linge après le dernier rinçage. Bien agiter la lotion Loxazol avant l'emploi et la répartir en quantités suffisantes sur tout le cuir chevelu ainsi que sur les cheveux humides. Le produit doit être soigneusement appliqué à la base des cheveux et des poils, où se retrouvent avant tout les poux et leurs oeufs (lentes) en raison d'un contact plus facilement possible avec la peau. Une bouteille de Loxazol suffit pour des cheveux mi-longs (atteignant les épaules) de densité normale. Laisser agir Loxazol pendant 10 minutes, puis rincer soigneusement les cheveux avec de l'eau et les sécher comme d'habitude.

Si nécessaire, une deuxième application peut être effectuée 7–14 jours plus tard. Les lentes restent attachées aux cheveux, même lorsqu'elles sont mortes, et ne sont pas indicatrices de l'échec du traitement. Eliminer les poux et lentes morts à l'aide d'un peigne fin.

Posologie particulière

Prophylaxie: posologie et emploi comme pour l'indication thérapeutique; l'utilisation une fois par semaine durant au maximum 8 semaines est recommandée.

Contre-indications

Loxazol est contre-indiqué en cas d'hypersensibilité avérée à la perméthrine, à d'autres pyréthroïdes ou pyréthrines synthétiques, ou encore aux autres constituants du médicament.

Mises en garde et précautions

Seulement pour l'usage externe.

Il est recommandé au personnel soignant, qui entreprend de fréquentes applications, de porter des gants.

Il faut éviter l'inhalation des préparations à base de perméthrine, en particulier par les asthmatiques.

On ne dispose pas d'expérience prolongée sur l'utilisation de Loxazol chez les personnes âgées; il n'y a cependant aucune raison de penser que ce groupe de population présente plus d'effets indésirables causés par la perméthrine. L'utilisation devrait toutefois se dérouler sous surveillance médicale, jusqu'à la disponibilité de données adéquates.

Chez les enfants de moins de 2 ans, Loxazol ne devrait être employé que sous surveillance médicale. Il n'existe pas d'information sur l'utilisation de Loxazol par des personnes présentant des affections cutanées. Eviter le contact de Loxazol avec les yeux ou les muqueuses. En cas de contact accidentel rincer abondamment à l'eau les yeux et les muqueuses.

Interactions

Aucune connue à ce jour.

Grossesse/Allaitement

Bien qu'aucune atteinte à la fertilité et au foetus n'ait été établie lors de l'emploi de perméthrine pendant la gestation chez le rat, le lapin et la souris, il a été démontré que la perméthrine passe au travers de la barrière placentaire et qu'elle est éliminée dans le lait maternel.

Les études effectuées sur les animaux ne sont pas toujours transposables à l'homme. Par conséquent, le risque potentiel est à évaluer soigneusement par rapport au bénéfice escompté.

Loxazol ne devrait pas être employé en prophylaxie par des femmes enceintes ou allaitantes.

Effet sur l'aptitude à la conduite et l'utilisation de machines

Loxazol n'a aucune influence sur l'aptitude à la conduite ou à l'utilisation de machines.

Effets indésirables

«Très fréquents» (≥1/10), «fréquents» (≥1/100, <1/10), «occasionnels» (≥1/1000, <1/100), «rares» (≥1/10'000, <1/1000), «très rares» (<1/10'000).

Troubles cutanés

Inconnu: prurit, bien que dans la majorité des cas celui-ci résulte de l'infestation et soit présent avant le traitement. Dans de rares cas, un exanthème et/ou une brûlure ainsi qu'un oedème du cuir chevelu peut survenir.

Organes respiratoires

Les pyréthrines d'origines naturelles et de synthèse contenues dans le Loxazol, peuvent engendrer des réactions d'hypersensibilité, en particulier des voies respiratoires.

Surdosage

Les résultats d'études effectuées sur les animaux laissent supposer, que le contenu de Loxazol en perméthrine ne serait pas suffisant pour déclencher de sévères dommages toxiques chez un enfant qui aurait avalé la totalité du contenu. Cependant, il serait possible que le contenu en isopropanol mène à une intoxication alcoolique chez un petit enfant.

Vu la résorption rapide de l'isopropanol, un lavage gastrique doit être effectué dans les deux heures. Orienter le traitement sur l'intoxication alcoolique et surveiller le bilan hydrique ainsi que le taux de glucose plasmatique. Dans des cas extrêmes, une dialyse sanguine ou péritonéale peut s'avérer utile pour rapidement éliminer l'isopropanol.

Propriétés/Effets

Code ATC: P03AC04

Mécanisme d'action

La perméthrine est rapidement absorbée par la cuticule de l'insecte et mène à une surexcitabilité sensorielle, des troubles de la coordination, et enfin à l'épuisement. L'activité ovicide de perméthrine est augmentée par l'ajout d'alcool aux composants aqueux.

Pharmacocinétique

Lors de l'utilisation du médicament conformément aux instructions, l'absorption de la perméthrine par la peau est insignifiante.

De plus, la perméthrine est métabolisée très rapidement.

Données précliniques

Des données spécifiques pour Loxazol ne sont pas disponibles.

Remarques particulières

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15–25 °C) et hors de portée des enfants. Ne pas mettre au congélateur.

Le médicament ne peut être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Remarques concernant l'application

Bien agiter avant l'emploi.

Après une application unique de Loxazol, la présence de la perméthrine est encore détectable dans les cheveux jusqu'à 8 jours après le traitement.

Numéro d'autorisation

51159 (Swissmedic).

Présentation

Loxazol lot 1% 59 ml. (D)

Titulaire de l'autorisation

Interdelta SA, 1701 Givisiez/FR.

Mise à jour de l'information

Septembre 2013.